



新型コロナワクチン接種は、5歳以上の人を対象に行ってています。

永平寺町の新型コロナワクチン接種

担当：保健センター 61-0111

3回目接種の効果

※厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より

オミクロン株に対する効果

2回目から25週後

発症予防効果 約10%に低下

3回目接種後（2～4週間）


約60～70%に回復

入院予防効果 44%に低下

44%に低下

92%に回復

永平寺町の年代別3回目接種率と全国の年代別3回目接種率の比較



永平寺町の接種率は、どの年代も全国より高い状況ですが、40代以下の接種率は低く、特に30代以下は50%に達していません。

長崎大学の16～64歳を対象にした研究では、3回目接種によるオミクロン株に対する発症予防効果は69%で2回接種の43%に比べて高いことが判明しています。他の変異株より弱まるものの、一定の効果があることが国内の研究でもはっきりしてきています。

接種券が届いたら早めに接種することをおすすめします。

12～17歳3回目接種

集団接種の優先枠設定

5月14日(土) 午後 *

永平寺町保健センター (松岡吉野塚 15-44)

ファイザー社ワクチン

要申込み

*集団接種最終。引き続き町内医療機関での個別接種を実施

5～11歳(小児)の接種もすすめています

公益社団法人日本小児科学会
新型コロナワクチンに関するQ&Aより

5～11歳の小児では16～25歳の人と比べて一般的に接種後の副反応の出現頻度は低かったと報告されています。

ワクチン接種後の発熱は、ほとんどが接種当日から翌日にかけてみられ、1日程度で解熱する場合が多いとされています。程度が軽い場合は、冷却などで様子をみていただくことでかまいません。発熱の程度に応じて解熱薬を使用することもできます。また、熱性けいれんを起こしたことがある場合、治療中の場合、薬などでアレルギー症状を起こしたことがある場合などは、事前にかかりつけ医に相談してください。



公益社団法人
日本小児科
科学会サイト